

เช็คสัญญาณ.. ใช้เลือดออกในเด็ก



ใช้เลือดออก โรคนอติในช่องฤดูฝนที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย วันนี้คุณหมอมีวิธีสังเกตอาการใช้เลือดออกในเด็กมาฝากกัน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างถูกวิธีนะคะ

- ใช้สูงลอย 2 – 7 วัน ใช้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส เมื่อหมดฤทธิ์ยาลดไข้ ไข้จะขึ้นใหม่
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร รับประทานอาหารและน้ำได้น้อยลง
- ปวดท้องรุนแรง กดเจ็บชายโครงด้านขวา โดยบางรายอาจมีอาการท้องอืด เบื่ออาหารร่วมด้วย หากมีอาการปวดท้องมากให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หน้าแดง อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามผิวหนัง บางรายอาจมีอาการเลือดกำเดาไหล ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือเลือดออกตามไรฟัน
- พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปจากปกติ เช่น มีอาการซึม ไม่ค่อยเล่น ไม่ร่าเริง พูดยาไม่รู้เรื่อง เอะอะโวยวาย ไม่ตอบสนองดีเท่าที่ควร หรือหากเป็นเด็กเล็กจะร้องกวนมากผิดปกติ
- ความผิดปกติภายนอก เป็นอาการที่สังเกตเห็นได้ชัด เช่น ปากแห้ง ตัวซีด ตัวเย็น เหงื่อออกมาก สีผิวคล้ำลงหรือตัวลาย เป็นต้น
- ปัสสาวะน้อย หรือไม่ถ่ายปัสสาวะนานเกิน 4 – 6 ชั่วโมง แสดงว่าร่างกายเริ่มมีภาวะขาดน้ำ

“อย่าลืมนะคะ.. หมั่นสังเกตอาการหรือความผิดปกติของลูกน้อย ถ้ามีอาการผิดปกติตั้งข้างต้น ควรรีบมาพบแพทย์
ค่ะ”

ข้อมูลดีๆ จาก.. พญ.นวลนภา อนันตสิทธิ์ กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว